

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 19-5-67 646759

**BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES**

PUBLICATION PÉRIODIQUE

**EDITION DE LA STATION DU VAL DE LOIRE ANGERS**

(MAINE & LOIRE, LOIRE ATLANTIQUE, SARTHE, INDRE & LOIRE, VENDEE, DEUX-SÈVRES, VIENNE)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux. Cité Administrative, rue Dupetit-Thouars.

C. C. P. Nantes 86-04-02

Tél. 88-30-34

88-06-15

Poste 571

ANGERS

**ABONNEMENT ANNUEL**

XXV F. 25 F.

BULLETIN N° 80 de MAI 1967 - SARTHE, MAYENNE .....	P. 22
MAINE-&-LOIRE, LOIRE-ATLANTIQUE, VIENNE, VENDEE .....	P. 21
DEUX-SÈVRES (y compris la région de la Gâtine) .....	P. 24

## CONCOURS DE DÉPISTAGE DES FOYERS PRIMAIRES DE MILDIOU DE LA VIGNE ET DE MILDIOU DE LA POMME DE TERRE.

Le dépistage des foyers primaires du mildiou de la vigne et du mildiou de la pomme de terre présente un intérêt considérable. C'est la raison pour laquelle la Station d'Avertissements organise, comme au cours des années précédentes, un concours de détection des foyers primaires de ces mildious.

RÈGLEMENT DU CONCOURS - Une prime de 30 N.F. sera attribuée aux trois premières personnes de chacun des départements dépendant de la Station qui enverront les premières taches de mildiou de la vigne ou de la pomme de terre.

Précautions à prendre au moment de l'envoi - L'expédition devra être faite sous pli cacheté et affranchi à :

Monsieur le Directeur de la Station d'Avertissements Agricoles  
du Val de Loire  
Cité Administrative - Rue Dupetit-Thouars - ANGERS 49

L'envoi aura son maximum de chances d'arriver en parfait état s'il est fait dans un petit paquet et si les feuilles sont enveloppées dans un peu de mousse ou de coton hydrophile légèrement humide. L'emploi des sacs en matière plastique est préférable pour les feuilles de vigne, il est déconseillé pour les feuilles de pommes de terre.

L'envoi devra être accompagné de renseignements qui pourront être consignés sur une formule du modèle ci-dessous :

Nom .....	<u>Mildiou de la vigne</u>
Prénom .....	- âge de la vigne .....
Adresse .....	- situation de la feuille sur la souche
Lieu de la découverte de la tache de mildiou .....	(1ère, 2ème, etc.....)
Date .....	- situation du vignoble : coteau .....
	plaine .....
<u>Mildiou pomme de terre</u> : variété attaquée .....	cuvette .....
importance de l'attaque...	- importance de l'attaque (nombre de ta-
traitements effectués.....	ches découvertes) .....
	- cépage .....

## AVERTISSEMENTS -

## ARBRES FRUITIERS

Chavelure du poirier - Les germes demeurent toujours très abondants. Les récentes pluies ont diminué l'efficacité du dernier traitement conseillé. Des taches sont apparues au début de Mai, d'autres doivent apparaître à la mi-Mai. En conséquence, effectuer un nouveau traitement dans les derniers jours de la semaine du 8 au 13 Mai.

Dans la région de la Gâtine dans les Deux-Sèvres, dans les vergers traités dans les premiers jours de la semaine du 1er au 6 Mai, effectuer un nouveau traitement immédiat. Dans les vergers qui viennent d'être traités, attendre de nouvelles informations pour intervenir.

.....

.....

SARTHE, MAYENNE .....	P. 23
MAINE-8-LOIRE, LOIRE-ATLANTIQUE, VIENNE, VENDEE	P. 22
DEUX-SEVRES (y compris la région de la Gâtine)	P. 25

Tavelure du pommier - Les conditions sont identiques à celles qui existent pour la Tavelure du poirier et les premières taches ont été observées début Mai. D'autres doivent également apparaître vers la mi-Mai. Par ailleurs, la végétation continue de s'accroître rapidement. En conséquence, effectuer un nouveau traitement dans les derniers jours de la semaine du 8 au 13 Mai.

Dans la région de la Gâtine dans les Deux-Sèvres, dans les vergers cultivés en forme basse et traités dans les premiers jours de la semaine du 1<sup>o</sup> au 6 Mai, effectuer un nouveau traitement immédiat. Dans les autres vergers qui viennent d'être protégés et sur la variété Reinette Clochard cultivée en forme haute tige, attendre de nouvelles informations pour intervenir.

#### INFORMATIONS -

Araignée rouge - Des pullulations importantes sont localement observées. En cas de nécessité, ajouter un produit acaricide à la bouillie anti-tavelure. En cas de difficultés, effectuer un traitement spécialement dirigé contre ce parasite.

Dans la région de la Gâtine dans les Deux-Sèvres, dans les vergers où des pontes importantes ont été observées, effectuer un traitement dès maintenant. Dans les vergers où les pontes sont peu abondantes, attendre pour intervenir.

Oïdium du pommier - Les germes sont très nombreux. Profiter du traitement dirigé contre la tavelure pour assurer, sur les variétés sensibles, la protection contre ce parasite.

Pucorons - Recrudescence de l'activité de ce parasite. En cas de nécessité, intervenir avec un produit aphicide.

#### AVERTISSEMENTS -

#### VIGNE

Black-Rot - Dans le vignoble de Neuville en Poitou, les projections d'ascospores sont commencées et la vigne a atteint un stade sensible. En conséquence, dans les vignes situées à proximité de foyers (ces foyers sont constitués par des parcelles abandonnées mal entretenues), effectuer un premier traitement dès réception de cette note. Dans les autres parcelles, attendre de prochaines informations pour intervenir.

L'Inspecteur de la Protection  
des Végétaux,  
J. DIXMERAS.

Les Contrôleurs chargés des Avertissements  
Agricoles,  
R. GEOFFRION - J. BOUCHET

Tirage du 9 MAI 1967 - 2.960 exemplaires.